

t

Chirurgica Dissertacion dela Rixa

Hecha de orden dela Rexia Academia Medica.

Matutense

25/

Por.

Dn. Andres Lopez Cobaleda, Quiruxano y
Vecino de esta Ciudad de Granada.

Mandaseme insertar M. y Siempre Rexia Acade-
mia, y aun que esto demas que preexigiere Don Graciano,
seapon loque el mismo termino de jura, quando no
Repugnante, con dificultad Composable en una tan Exigua
herudicion como lamia que esto (sin agravar anadie)
por llamarla insipiencia ciega, no obstante mi Servil
Obedencia Abultara deseos con palabras aunque siempre
cortas para significar sus gratitudes; Mas si el Conocim^{to}
de esta verdad no huiere Aceptable el Sacrificio, de Justicia
pido la Absolucion pues me confieso.

Pareciome a proposito tomar por Assumpto la
Rixa, no porque quierá solo ver la Rixa en el axero Oso
si porque sirva de Aclararme el proprio, para loqual supongo
que aun que la Rixa principiá en un Tuberculo o Apothem
pequeno mas o menos duro hecho en el Argulo mayor
del Oso, Al fin termina por lo Comun en Ulcera Como

2/
Al Cancro acontece En Caries O Corrosión del hueso;
por cuiá Razon segun la naturaleza material que el Abuso
compone y estados diversos que este Abuso transita con
varias denominaciones se apellida ya Anchylops sino
tiene insición o Ulceración, que sea notable, daque
tambien suelen llamar Rixa incompleta, ya Craab.
quando el tumor es duro y mobile, como Charadula; y final-
mente quando esta ya notablemente Ulcerado denomi-
nanle Completa Rixa T. Ceylops. y aun que otros quie-
en que este sea nombre Genérico a qualquiera otra especie
de Rixa nome éde detener en Cuestiones de Voz.

Delo dho deducir se puede que es la Rixa, un
tumor pequeño con Ulceración, osin ella hecho en el Angulo
maior del Oxo por causa Externa y Interna y yndisposi-
ción propia de la parte donde por Causa Externa Pues suele a
golpe, herida, y contusion, seguirse una Rixa. la causa
ynterna O anterior de este afecto, por lo regular esta him-
pha que separada por la Charadula lacimal si trahese
visiades, omata Qualidad que la yncrase, no pudiendo por
su tenacidad transolar por el punto del Saco lacimal
para descargar en su comun desagadero, las nauires
y Boca haze Remanso y estancada la himpha en el ciepo
aquaducto donde adquiere mas y mas gelatinosidad
haze el tumorcillo mas o menos duro, sinzere o compues-
to segun su naturaleza duracion y disposiciones que
fueren Adquiriendo los primeros principios del tumor
que le causa. Explicome; si la himpha fuere solo Craab

sin *Sicc* Adsubamen o Admixtion de mala qualidad
es el tumor Saludable, molle, sin *ynflammacion*, poco
o ningun dolor; mas si trahere qualidad Benerea es
corbutica o Cancrosa, Siempre Conspira con la naturaleza
de su causa sellandose con el *Caracter* Reproduciendo hijos
de aquella *ynfame* *Piole*.

Finalmente si por la diuturnidad (que es lo mas frecuen
te) detenido el material en la parte se empiezan ya a exple
car los activos principios de aquel Caos en que los tubo la cau
sa conjunta susetos, quiero decir los Sales de que como mixto
esencialmente consta notablemente se varia el tuberculo; En
asi, se fueren acidos, lixidos, nitrosos, o de naturaleza
Vitriolada, haueso el tumor esquistoso, duro, lapideo, y
calloso, aun que sin dolor, ni *ynflammacion*, mas si al A
cido se le aguiere lo sulphureo, precedida tumultuosa
fermentacion, Calor, Dolor, *ynflammacion* Turgidas venas
Subiede Ulcera Cancrosa, Caries, exoron, en las partes ve
zinas y otros varios *Simpthomas*.

Dize que por *yn*disposicion de la parte Suele venir
la lixa pues Relaxada u Obstruida la parte organica
del Saculo o punto lacimal se presa la linpha o por venir
en maior copia o hallar cerrado el paso, sin duda aconte
ceran dichos Efectos.

Devanse ya Bastrear los propios y naturales atri
butos de la lixa por lo Respectivo a la causa material, estado
y alteraciones que padece; Restara delinear los propios y
Caracteristicos Senales que segun los varios *Simpthomas*

Resultan de toda la entibad del morbo. En la Rixa, ni completa, ni Ulcera, El Color es blanco, o natural de la parte, con poco, o ningun dolor, sin Comprimiñe; mas si el tumor antes de Romperse (como suele) esta ya afistulado, o compresado, suele desaparecer subiendo al lacrima, o bajando por el Conducto ala nariz, un Suero, o lympho glutinosa, mas o menos semejante a materia.

En la completa, o ulcerada Rixa, El Color es Albicante, palido, o oscuro, con inflamacion, y dolor, los margenes de la ulcera, suelen ser Callosos, las Venas Circumbecinas, turgidas, y denegridas, Como las Varices; y si vbiere Corrosion en el hueso unguis (lo que se conoce entrando la piqueta) la materia que manna, es subtil, de mal Color, fetor, y con mordacidad.

La Rixa de Suo es Afecto Chronico, y tanto mas dificil de Curar, quanto mas diuturna, y enbehecida fuere la yncompleta Reciente, y sin praba qualidad ni Adci- dentes, es Curable; Acas la ulcerada fistulosa Corrosiva, o con Caries, es peligratissima, y dificil de Curar quando no ymposible por la delicadez, y principalidad del sitio, y si la Corrosion penetrare hasta la nariz, es yncurable, si se juntare con Qualidad maligna Cancerosa de Pascente, es ymposible de Curar; y abetres degenera en notum tangere, y suele ser lethal.

Si guiendo en la Curacion el methodo de los mejores Practicos, la principiarse contra yntenciones: depondre

Lo Interesente, ebaquaré lo conjunto y confrontaré
 la parte la causa antecedente, sepondrá Conforme a
 su Redundancia, precediendo el Consejo de Caballero de
 dico, si hubiere plañitud por Sangrías, y si Caetichimo
 con purgas, guardando Entodo el orden de los yndi-
 cantes Condidantes y Correpyonantes.

En la deposición de la causa. conjunta Seade baxian
 el methodo conforme a la causa, estado, naturaleza y sím-
 pthomas que duxian, Segun lo qual En la Rixa yncipi-
 ente yncompleta laudable sin Ulceracion dolor ni ynf-
 lamacion, usaré solo de los blandos Resolutivos mixtos
 con los confortantes, y de Obstruientes, Complicandolos
 estos Segun la dureza biniidad y accidentes del tumor
 yndicarei, y si se Supura darei lomas presto que pueda
 salir al material.

En la completa ulcerada Rixa, si hubiere dolor
 y ynfiamacion notables, usaré de los Refrijerantes y lenes
 Sedativos mixtos, con los dulcorantes y Resolutivos en la
 parte y por lo ynterno exhibiré aborobentes testaceos con
 los atemperantes. Si tubiere Adjsuna qualidad venerea
 escorbutica, omaligno, Cancerosa con Antegalicos, anti-
 escorbuticos, y alexipharmacos anticancerosos, tan por lo
 externo aplicado, como por lo ynterno dado, procura-
 ré domar el producente, y producto de la Rixa.

Si fuese la Ulcera Callosa Conspistula o Corrosion
 de hueso, procuraré ablandar o quitar el Callo avn que

Sea necesario aplicar algun medicamento en potencia
Cautico siempre teniendo ante los ojos la delicadeza
del Sitio para quitar la Corrosion, es denotar si esta solo
Superficial o profunda. Si es Superficial, basta con la
graxa hasta encontrar lo yncorrupto; mas si fuese
profunda, a vezes sera necesario Cauterizar con fuego,
siendo este, como ultimo Remedio y principal Correc-
tor delo nocivo, aplicando despues de hecha la operacion
los axiomas queparezcan ydoneos para perfeccionar
la cura, y cumplir con la curacion yndicazion.

La siempre Ill. y Rev. Academia Congrega-
da deo vuestras de mi Cortesia en este Assumpto, no
checho como rememando lo que discreta Abexa; Si
solo qual torpe y inutil Arana Caxido futil en
redes, Acetad Ill. Academia, conpiadoso y benigno
pecho la yntencion, que ami solo me quedara el con-
suelo, que Dios todo lo Cria, Adorna el uniberso, ya
fini de todo Dios que sea bueno Acosorandole con
Santa Bendicion

Dr. Andres Lopez
Cobacola