

Flagito á te, ornatissime lector, ut
oculis indutagentibus libentique ani-
mo, hanc narrationem legas.

D.ⁿ Juan Marrigue, de edad de cuarenta y cuatro años, de temperamento nervioso é idiosincrasia hepática (empleado en la Mayordomía mayor del Rey N. S. q. d. gr.) el día veinte y tres de Agosto del año proximo pasado, después de un poco de calor, se empezó á resentir de un dolor punzante en la región hipogástrica, con estension aún arriba á la umbilical, cogiendo parte de la ilíaca derecha, q. no le permitía andar ni enderezarse, presentándole en la parte tumor circunscripto

con calor, rubor, y tension, acompañada de fiebre, sed y disgusto o malestar general q. se subdieron aynella noche. Llamado un Profesor de Medicina, opino q. el enfermo padecía un colico nervioso y le propino en el momento una mixtura antispasmodica, enemas emolientes, y una porcion purgante, prescribiendole dieta de caldos tenues. Siguió al siguiente dia lo mismo con un desasosiego grande; se le aplicaron diez y ocho sanguijuelas al tumor, cataplasma emoliente encima y p.^a verida el mero tamarindado; cada vez seguia peor, presentandose nauseas y vomitos de una materia como ilo ne

gras cortados en pequeños pedazos (en
presiones de los interesados) sudores frios
de medio cuerpo arriba, con fiebre. En
el transcurso de cuatro días se le apli-
caron treinta y seis sanguijuelas al ri-
tío del dolor, cataplasmas emolientes y
anodinas, baños generales calientes; ad-
ministrándole unaqua atemperante, por-
ciones calmantes y algún lamedor de
jarabe, siguiendo la dieta. No mejo-
randose nada el enfermo fueron llama-
dos á consulta otros dos Profesores de
Medicina, los q. confirmaron la clasi-
ficacion q. el de cabecera habia for-
mado, determinando la repetida apli-
cacion de sanguijuelas al ano en un
mero de tres docenas, con otras trece de

cenos mas al rito del tumor; repetir
los baños calientes, y propinarle á la vez
ó alternando los calmantes, y purgan-
tes: abeneficio de lo q. se consiguió ce-
diesen los vomitos y sudores, siguiendo
el enfermo p.^r lo demas en el mismo
estado, presentandose el tumor pastoso
y como fluctuante, p.^r lo q. determi-
naron consultar á un Cirujano á
fin de q. venciese si aquel tumor
era la causa primaria del mal y si
comberdria ó no dilatarse. (Pues le crei-
an ya un absceso) El Profesor de la
R.^a Familia q. asistio como Cirujano
manifesto q. el enfermo lo q. pade-
cia hera una hernia iliaca; p.^r lo q.
dispuso la Laxis á reduccion manu-

al aplicando despues, 3.^o una estopa-
da con incienso aguardiente y Uema de
luneso, 2.^o un corse sobre una grandey
desproporcionada compresa graduada en
papada en un vino aromático, prognosti-
cando ser imposible la curacion radical
p.^r el estado en q.^{ue} se hallaba el enfermo
la especie de dolencia y su sitio. Com-
movidor los interesados p.^r el pronostico
tan poco satisfactorio procuraron vieran
al enfermo otros varios Cirujanos; efec-
tivamente tres seguidos le observaron y
todos tres opinaron del mismo modo,
tanto en el diagnostico y pronostico
de la enfermedad como en el plan
curativo, modificando solo el vendaje
de cuerpo y la compresa haciendola ya

mas grande ya mas pequeña o voluminosa.

Por una casualidad, q. es inoportuna al presente su narracion, fui llamado, en compania de otro Profesor condisapulo mio del M^o Colegio de S.^{ra} Carlos, p.^a q. consultásemos con el de cabecera afin de determinar lo q. se podria hacer en el estado en q. el enfermo se encontraba.

Hecia p.^r los asistentes, y confirmada p.^r el Profesor, la narracion q. antecede, para á observar clinicamente al enfermo y le alle un sujeto alto del ya dicho temperamento, flaco p.^o q. reconocia haber tenido unas carnes regulares, bien desarrolladas, descolorida la piel, en

postura supina con dificultad p.^a au-
sarse boca abajo y aña el lado izquier-
do, verificandolo sobre el derecho cuan-
do se comprimia el tumor con la ma-
no, pulso debil, pegneno y por frequen-
te, p.^a q. se hacia mas p.^a las tardes, ca-
lor moderado, manifestando representaba
la afeccion febril se aumentaba en espe-
cial en las palmas de las manos, algu-
na sed, anorexia, lengua cubierta de u-
na capa blanca algo rubicunda en sus
bordes y punta, dolores vagos de vien-
tre, en especial en el sitio del tumor q.
aparecia en el sitio en q. las fibras
musculares del obliquo externo bajan o
bucinando de atras aña adelante, p.^a
mas aña su parte inferior q. superior

como a' seis Haveres de dedo separado
de la linea blanca, cuya extension hera
de dos pulgadas a tres en una direccion
vertical, notandose en este sitio una a-
pertura cuya mayor separacion hera co-
mo una de seis a' ocho lineas toda cir-
cuida, en especial hacia abajo de una
durera indolente.

Se percibia solo altrabres de los
tegumentos un cuerpo blando con una
especie de crepitation al tocarlo, q. cons-
tituia el tumor, desapareciendo a' la
compresion, (torandose en este momento
los bordes de la abertura) p.^o presentan-
dose tan luego como esta cesaba. El
vientre unas veces estaba tardo otras
se precipitaba, la orina regular.

El Profesor q. asistia al enfermo no
tuvo dificultad en clarificar la enferme-
dad de una hernia entero-cele q. en
su principio fue entero-epiplo-cele, p.^o
la q. aun parecer salia el intestino co-
lon y q. unicamente creyendolo asi pro-
drian explicarse los dolores colicos; aña-
diendo q. aun parecer creia incurable la
enfermedad p.^o ser una hernia y en
un sujeto de mas de cuarenta años, p.^o
q. parecia estar tambien desgarrado el
peritoneo y p.^o q. el enfermo habia pade-
cido mucho, y mucho mas p.^o las acries-
nes febriles vesperinas.

Por mi parte negué el nombreda-
do a la enfermedad, pues hernia consi-

deramos ser la salida de las partes
contenidas p^o un agujero natural di-
latado, formando así un sacro llamado
herniario la membrana serosa de la ca-
vidad á q. pertenecen las partes; mas
en el presente caso habian salido esu-
erto, las partes contenidas p^o fue p^o
un sitio donde absoluta^{te} habia abertura
alguna, y su salida se verificó á es-
peranza de la separacion de las fibras
q. constituyen las paredes abdominales,
formando una abertura no natural
es decir una herida, pudiendo creerse
dislacerado el peritoneo puesto q. no
se percibia absoluta^{te} mas q. el inte-
rino, pudiendo creerse q. tal vez la

estrangulacion fue efecto o conse-
cuencia o bien de un pectico de esta
serosa q. se inflamo de o bien de una
garradura: por consecuencia no se po-
dia denominar el padecer presente mas
q. una Estrangulacion, pues habian sa-
lido, esforzadas las partes contenidas, p.
un sitio cuya abertura era accidental,
pues asi como un instrumento cor-
tante separa las partes externas u-
na causa tal vez desahogada pudo se-
parar las fibras de estos tejidos, bien
relajandolas, bien dilatandolas antes, p.
la insercion de la misma causa has-
ta formar la abertura q. permitio la
salida de las partes; lo q. prueba q. los
tejidos se dislaceran a las veces sin otra

causa q. un esfuerzo en su misma
unión.

Causas: procure analizarlos con el ma-
yor esmero y no encuentre mas q. los
esfuerzos q. pudo hacer el enfermo
hiriendo. La estrangulación pudo de-
berse en un principio a q. relajadas
las fibras musculares se interpusiere un
pedículo del peritoneo, q. este se infla-
mo y se supuro o gangrenó, perme-
tiendo el paso a los intestinos q. fue-
ron separados mas las fibras, o dis-
lacerandolas, o bien rompiendose é-
llas y la serosa simultanea^{te}. Ocú-
rriendose de este modo, la estrangu-
lación.

Diagnostico; he dicho q. lo considero

como una Obstruccion; el intestino
obstruido era sin duda una porcion
perteneciente al Ileon, apesar de q.
se dijo ser el Colon, la Anatomia
demuestra q. la situacion de este ulti-
mo intestino no es tan apropiado en
este sitio para obstruirse como el
primero, p.^a en colocacion y multipli-
cadas circunvoluciones.

Varcio á la verdad sorprendente
en la presentacion de la enfermedad, los
síntomas á'larmantes q. se manifestaron,
pero reflexionando un momento es
bien facil conocer la razon: si es algo
frecuente la salida de los intestinos p.^a
la relajacion o dilatacion de las fibras
musculares, no lo es tanto p.^a un ras

ganiento y menos constituyendo una
extrangulacion; ya he dicho q. esto fue
lo q. sucedio en este caso como lo de
mostraron, los naseas, los vomitos in-
quietud desazoniego general; &c. &c. En
su principio salio una considerable
porcion de intestino y si seguiere aun
una porcion del quilon; Hubo es-
trangulacion q. sin conocerla la ma-
taron bien casual.^{te} evitandov un fu-
nesto resultado los repetidos golpes
de sanguijuelas y baños calientes;
en una palabra el acaro libro
al enfermo de los bordes del sepul-
cro.

Prognostico: prognostique favorable

mente, persuadido de q. un tejido á-
nalogo separado se une con mas faci-
lidad q. partes desemejantes, y mucho me-
jor cuando sigue la herida la direccion
de las fibras segun sucedio en este caso.

Curacion: Esta mas facil en una
masa muscular herida p.^a un instra-
mento cortante q. la reunion p.^a pri-
mera intencion; mi objeto en el pre-
sente caso no fue otro q. procurar la
reunion de los bordes p.^a efectuar la
curacion, notiendo posible satisfacerlo
de otro modo q. con un vendaje en
razon á estar la solucion debajo
de los tegumentos, no pudiendose em-
plear otros medios q. los aponitos, y

habiendo demostrado la experiencia
q. ni los vendajes de cuerpo se po-
dian aplicar bien en el enfermo, y q.
nitas, compresas ni ellos formaban
una presion como debia verificarse,
propuse aplicarle un vendaje q. ren-
tiese la doble indicacion de reunir
los bordes de la herida y contener la
salida de las partes.

Una compresa graduada, dura y
de dos pulgadas y media de largo
p. ocho lineas de ancho (1) (pro-
porcionada al hueco de la abertura)
y q. debia empujarse en un conimi-
ento aromático resolutivo: unas tiras
de emplastro áglutinante de Andres

(1) Veanse la demonstracion dada en la fig. 1.^a

de la Cruz, de cuatro á cinco pulga-
das de largo y media en su mayor
ancho en forma de cola doble de Go-
londrina (1) dos compresas fuertes quadra-
das de dos á tres pulgadas de largo
por otras dos y media de ancho. (2) U-
na compresa en forma de colchon, es de-
cir inclinada y apretada de ilas para a-
plicarla encima, de una magnitud pro-
porcionada p.^a cubrir todo el aposito, (3)
y un vendaje de cuerpo con su R. de
ano y su escapulario escotada en los
sitios q. correspondan á las espinas an-
teriores y superiores de los huesos ⁴león,

(1) Véase la demostracion Lamin. 3.^a fig. 2.^a

(2) -- 2.^a dem. idem 3.^a

(3) -- 3.^a dem. idem 4.^a

y además en la parte q. correspon-
dia á la inferior del aporito, una por-
cion de lienzo unida al bendaje y q.
iba disminuyendo hasta terminar en un
vendete (5).

Prebendo todo el aporito, y que-
dando á mi cargo el enfermo p.^{te} ce-
sion del facultativo q. le visitaba, ape-
sar de mi resistencia, di principio á la
curacion radical el dia veinte y seis de
Octubre del año pasado, p.^{te} la reduci-
on de las partes, lo q. se verifico in-
mediata y completamente, y despues de
comprimir la abertura con mis propi-
os dedos, y un ayudante reuñiere los bor-
des; aplique la compresa graduada
(5) Vase la demonstracion Lami. 2.^a fig. 1.^a

(empapada en un coimiento de vino blan-
co, rosas, miel de ajonjolí, cortera de roble y
tomero) al reunido nuevo q. quedaba.

Después cogiendo una tira de emplastro, la
fije p.^{ta} un extremo en la parte inferior
e izquierda de la abertura, estirando el
tegumento y sosteniendo la aproximación
de los bordes, y p.^{ta} el otro lado quedó fi-
jada en la p.^{ta} superior, haciendo lo
mismo con otra y aplicando la terce-
ra en la parte media y en dirección
transversal á las dos; para mante-
ner después la aproximación de los bor-
des puse á los lados (en dirección sen-
perpendicular al pubis) las dos compres-
as cuadradas (1) y sobre todo la in-

(1) Véase la Lámina 3.^a

chida, y sobre todo le aplique el
vendaje de cuerpo fijando la L de ano
y el escapulario, llevando p.^o debajo del
muslo la porcion de lienzo q.^o habia
de sujetarse al vendaje. (1) Aplicado to-
do en esta forma, dispuse q.^o el en-
fermo estubiese á dieta, y q.^o permane-
ciere en postura supina, lo q.^o obser-
bo p.^o tres dias alcabo de los cuales
p.^o estar fatigado el enfermo de esta
postura le permiti acostarse un poco
de lado, observando la dieta con ri-
gor, sin olvidar el estado en q.^o se en-
contraba el p.^o tan rigurosa dieta co-
mo habia sufrido, y p.^o el exento
numero de sanguisuelas q.^o se le habian
(1) Vase la demonstracion Lam.^a 4.^a

aplicado.

Después de la colocación del apósito
sintió unos ligeros dolores en todo el sitio
q. estaba comprimido; los cuales le duraron
cuatro días inchándose alguna vez las
partes contiguas p.^a lo q. se dispuso (p.^a pre-
caber una grande inflamación) magna d-
temperante á pasto compuesta del coimien-
to de cebada con el zumo de naranja,
paños emolientes sobre el apósito de un
coimiento de la semilla de zaragatona
usando del mismo p.^a tres enemas al
día, pero viendo q. no pasaba de unos
límites regulares y considerando quan
indispensable era la presentación de
la inflamación adésica, me abstuve de

emplear otros medios, y afortunada^{te}
todo se calma á los seis ó siete dias, en
cuya epoca p^o estar la lengua sin in-
flamacion y el enfermo tener apetito, le per-
miti tomar una sopa ligera y le dis-
puso el uso de las leches, emperando
p^o la de cabras, abeneficio de loq. fue to-
mando fuerzas el enfermo, presentandose
la piel de buen color, regularizandose el
pulso y faltando las afecciones ó calen-
turas diarias q. le afeccionaban p^o la tar-
de, abeneficio de una tintura de Qui-
na aromatizada con la cascara de limon.
Sin olvidar la irritacion bronquial q. le
producia la tos, procurando calmarse
la abeneficio de jarabes usando enes

pecial un lamador compuesto de
Jarabe de flor de violetas y de alba
de cada cosa una onza, y onza y media
del de diacodion, abeneficio de lo que
conseguió el efecto.

A los quince dias de curacion, es
decir el dia diez de Noviembre, determi-
ne (mediante a q. el enfermo se movia
bien de un lado á otro sin incomodidad
y q. comia y dijera regular.^{te}) levantar
el vendaje de cuerpo p^a ver en q. estado es-
taba el aporito, verificada la inspeccion obser-
ve p^a el espacio q. permitian las compre-
sas quadradas q. la durera q. circunla
abertura, estaba casi totalmente extinguida
y q. á la vision parecia miederte lo.

misma, en vista de lo q. me confirme,
con tan presentes datos, en el diag-
nostico y prognostico de la enferme-
dad.

En el espacio de diez y nueve
dias q. transcurrieron hasta el veinte
y nueve del expresado noviembre; fue
sufriendo el enfermo considerablemente
presentandose un buen apetito, y de
sempañando sus funciones perfectas
y regulares. En el citado dia veinte y
nueve levante p.^o completo el apoplejia,
y hallé, habia desaparecido la abor-
tura no paritiéndose la mas pequeña
durera; aconseje al enfermo en tales
circunstancias q. p.^o algunos dias

usase de las carnes y la leche de
burra, con el fin de asegurar mas la
salud del paciente, y de no fatigar su
delicado tubo intestinal con comidas
de difícil digestion, q. usase p.^r algun
tiempo de un vendaje de cuerpo a mo-
do de corse, y una compresa suabe p.^a
q. nos se volviera a verificar la solu-
cion p.^r qualquier esfuerso, estando tan
reciente su union, con lo q. ha consegui-
do el enfermo lo q. me habia propu-
esto, es decir q. fundado en datos (q. me
proporcione el sentido del tacto) me pro-
pusse, no creyendolo imposible como se
habia dicho, la reunion y curacion ra-
dical de la Elestracion entero-cete

como lo acredita el sujeto q. pue
de manifestar su abdomen en el q.
no se percibe la mas minima re-
nal. Madrid 13 de Febrero de 1832.

José Marcelino Abades y Neram



fig. 1.^a





fig. 2.



2.



3.



fig.

3.



fig. 4.




figura 1.^a Composiça
figura 2.^a Linhas de
figura 3.^a Composiça
figura 4.^a gran com
figura 5.^a Composiça

Fig.







Fig. 2.



2.



2.



3.



Fig.

3.




Fig. 4.





figura 1.^a compresa gran
bucada

figuras 2.^a tiras de em
plasto aglutinante.

figuras 3.^a Compre
sas - quadradas.

figura 4.^a gran com
presa incluída




Explicacion

- 1 Vendaje de cuerpo.
- 2 Huesos para la columna ^{Cervical}
- 3 Escapulario.
- 4 Fe de ano.
- 5 Faja de lienzo unida al vendaje en el sitio del apo. ^{Cito}
- 6 Venillas para el escapulario
- 7 Dm. para la fe de ano.
- 8 Dm. para el vendaje.
- 9 Cintar del vendaje.



- * apósito colocado
1. compresa graduada
2. tiras del em
plastro.
3. compresa que
se



* Vendaje aplicado

L. O. de 18 de Feb.^o de 1832



N.^o 57

25/

Stygio à te, ornatissime leuon, ut
oculis indubitantibus libentique hui
us, hanc narrationem legas.